

Übersicht über die indikatorspezifischen ICD/OPS-Kodes des Auswertungsjahres 2022 für die Erfassungsjahre 2021 & 2020 (Stand: 20.09.2022)

58000: Operationsbedingte Gallenwegskomplikationen innerhalb von 30 Tagen	
5-512%	Biliodigestive Anastomose (von Ductus hepaticus, Ductus choledochus und Leberparenchym)
5-513%	Endoskopische Operationen an den Gallengängen
5-514%	Andere Operationen an den Gallengängen
5-515%	Exzision und Resektion von erkranktem Gewebe der Gallengänge
5-516%	Andere Rekonstruktion der Gallengänge
UND	
K83.3%	Fistel des Gallenganges
K83.1%	Verschluss des Gallenganges
K83.8%	Sonstige näher bezeichnete Krankheiten der Gallenwege
K83.9%	Krankheit der Gallenwege, nicht näher bezeichnet
K91.81%	Insuffizienzen von Anastomosen und Nähten nach Operationen an Gallenblase und Gallenwegen
K91.88%,	Sonstige Krankheiten des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, anderenorts nicht klassifiziert
S31.83%	Offene Wunde (jeder Teil des Abdomens, der Lumbosakralgegend und des Beckens) mit Verbindung zu einer intraabdominalen Verletzung
S36.18%	Verletzung: Gallengang
T81.2%	Versehentliche Stich- oder Risswunde während eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
58004: Weitere postoperative Komplikationen innerhalb von 30 Tagen	
I26.0%	Lungenembolie mit Angabe eines akuten Cor pulmonale
I26.9%	Lungenembolie ohne Angabe eines akuten Cor pulmonale
I80.1%	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis der V. femoralis
I80.28%	Thrombose, Phlebitis und Thrombophlebitis sonstiger tiefer Gefäße der unteren Extremitäten
I82.2%	Embolie und Thrombose der V. cava
K56.0%	Paralytischer Ileus
K56.6%	Sonstige und nicht näher bezeichnete intestinale Obstruktion
K56.7%	Ileus, nicht näher bezeichnet
K91.3%	Postoperativer Darmverschluss
58002: Eingriffsspezifische Infektionen innerhalb von 30 Tagen	
5-541.4%	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Anlegen eines temporären Bauchdeckenverschlusses
5-894%	Lokale Exzision von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut
5-896.0b%	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Kleinflächig: Bauchregion

Übersicht über die indikatorspezifischen ICD/OPS-Kodes des Auswertungsjahres 2022 für die Erfassungsjahre 2021 & 2020 (Stand: 20.09.2022)

5-896.1b%	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig: Bauchregion
5-896.2b%	Chirurgische Wundtoilette [Wunddebridement] mit Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion
5-900.1b%	Einfache Wiederherstellung der Oberflächenkontinuität an Haut und Unterhaut: Sekundärnaht: Bauchregion
5-916.a3%	Temporäre Weichteildeckung: Anlage oder Wechsel eines Systems zur Vakuumtherapie: Am offenen Abdomen
8-176.0%	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei liegender Drainage (geschlossene Lavage)
8-176.1%	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Bei temporärem Bauchdeckenverschluss (programmierte Lavage)
8-176.2%	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Am offenen Abdomen (dorsoventrale Lavage)
8-176.x%	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: Sonstige
8-176.y%	Therapeutische Spülung des Bauchraumes bei liegender Drainage und temporärem Bauchdeckenverschluss: N.n.bez.
8-191.10%	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Ohne Debridement-Bad
8-191.11%	Verband bei großflächigen und schwerwiegenden Hauterkrankungen: Fettgazeverband: Mit Debridement-Bad
8-192.1b%	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig: Bauchregion
8-192.2b%	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Einlegen eines Medikamententrägers: Bauchregion
8-192.3b%	Entfernung von erkranktem Gewebe an Haut und Unterhaut ohne Anästhesie (im Rahmen eines Verbandwechsels) bei Vorliegen einer Wunde: Großflächig, mit Anwendung biochirurgischer Verfahren: Bauchregion
UND	
A40%	Streptokokkensepsis
A41%	Sonstige Sepsis
K65.0%	Akute Peritonitis
K65.8%	Sonstige Peritonitis
K75.0%	Leberabszess
L02.2%	Hautabszess, Furunkel und Karbunkel am Rumpf
L03.3%	Phlegmone am Rumpf
T81.3%	Aufreißen einer Operationswunde, anderenorts nicht klassifiziert
T81.4%	Infektion nach einem Eingriff, anderenorts nicht klassifiziert

Übersicht über die indikatorspezifischen ICD/OPS-Kodes des Auswertungsjahres 2022 für die Erfassungsjahre 2021 & 2020 (Stand: 20.09.2022)

58003: Interventionsbedürftige Blutungen innerhalb von 30 Tagen	
8-800%	Transfusion von Vollblut, Erythrozytenkonzentrat und Thrombozytenkonzentrat (Wird nur gewertet, wenn es eine intra- oder postoperative Transfusion gab. Abfrage nach intra- oder postoperativ erfolgt über den QS-Bogen)
8-803.2%	Gewinnung und Transfusion von Eigenblut: Maschinelle Autotransfusion (Cell-Saver) ohne Bestrahlung (Wird nur gewertet, wenn es eine intra- oder postoperative Transfusion gab. Abfrage nach intra- oder postoperativ erfolgt über den QS-Bogen)
ODER	
D62%	Akute Blutungsanämie (Wird nur gewertet, wenn nicht bereits vor Aufnahme bekannt)
T81.1%	Schock während oder als Folge eines Eingriffes, anderenorts nicht klassifiziert
58001: Reintervention aufgrund von Komplikationen innerhalb von 90 Tagen	
5-380.6%	Inzision, Embolektomie und Thrombektomie von Blutgefäßen: Arterien viszeral
5-383.97%	Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior
5-383.98%	Resektion und Ersatz (Interposition) von (Teilen von) Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis
5-384%	Resektion und Ersatz (Interposition) an der Aorta
5-389.97%	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. cava inferior
5-389.98%	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. iliaca communis
5-389.9d%	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. portae
5-389.9k%	Anderer operativer Verschluss an Blutgefäßen: Tiefe Venen: V. renalis
5-449%	Anderer Operationen am Magen
5-467.0%	Anderer Rekonstruktion des Darmes: Naht (nach Verletzung)
5-469.7%	Anderer Operationen am Darm: Übernähung eines Ulkus
5-501.0x%	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Exzision, lokal: Sonstige
5-501.20%	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Offen chirurgisch
5-501.21%	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Laparoskopisch
5-501.22%	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
5-501.23%	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Perkutan
5-501.2x%	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Keilexzision: Sonstige
5-501.x1%	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Laparoskopisch
5-501.x2%	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Umsteigen laparoskopisch - offen chirurgisch
5-501.xx%	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): Sonstige: Sonstige

Übersicht über die indikatorspezifischen ICD/OPS-Kodes des Auswertungsjahres 2022 für die Erfassungsjahre 2021 & 2020 (Stand: 20.09.2022)

5-501.y%	Lokale Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Leber (atypische Leberresektion): N.n.bez.
5-505%	Rekonstruktion der Leber
5-541.0%	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Explorative Laparotomie
5-541.1%	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Laparotomie mit Drainage
5-541.2%	Laparotomie und Eröffnung des Retroperitoneums: Relaparotomie
5-542%	Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Bauchwand
5-545%	Verschluss von Bauchwand und Peritoneum
5-549.5%	Andere Bauchoperationen: Laparoskopie mit Drainage
8-153%	Therapeutische perkutane Punktion der Bauchhöhle
5-983%	Reoperation (Wird nur während des Indexaufenthaltes gewertet)
ODER	
K76.2%	Zentrale hämorrhagische Lebernekrose
K76.3%	Leberinfarkt
58005: Weitere postoperative Komplikationen innerhalb eines Jahres	
5-469.1%	Andere Operationen am Darm: Bridenlösung
5-469.2%	Andere Operationen am Darm: Adhäsiolyse
5-536%	Verschluss einer Narbenhernie
ODER	
K43.0%	Narbenhernie mit Einklemmung, ohne Gangrän
K56.5%	Intestinale Adhäsionen [Briden] mit Obstruktion
T81.5%	Fremdkörper, der versehentlich nach einem Eingriff in einer Körperhöhle oder Operationswunde zurückgeblieben ist
T81.8%	Sonstige Komplikationen bei Eingriffen, anderenorts nicht klassifiziert
K91.9%	Krankheit des Verdauungssystems nach medizinischen Maßnahmen, nicht näher bezeichnet
T81.9%	Nicht näher bezeichnete Komplikation eines Eingriffes
58006: Sterblichkeit innerhalb von 90 Tagen	
Dokumentation des Entlassgrundes „Tod“ oder Übermittlung eines Sterbedatums von der Krankenkasse	