

## Relevante Änderungen der Rechenregeln zum Auswertungsjahr 2025 | Verfahren Perinatalmedizin (QS PM)

Für das Auswertungsjahr 2025 erfolgen im Verfahren QS PM relevante Änderungen in den endgültigen Rechenregeln im Vergleich zu den endgültigen Rechenregeln des Vorjahres. Über diese möchten wir Sie gerne informieren:

### Modul Neonatologie (NEO)

QI ID Name	Änderung
51070 - Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen	<p><b>Neue Art des Wertes</b>  <b>Transparenzkennzahl</b>  <b>Anmerkung:</b> Für die Sterblichkeit wurde ein neuer QI eingeführt (QI ID 222402, siehe unten), bisher war der Referenzbereich ein Sentinel Event.</p>
222402 - Sterblichkeit im Krankenhaus bei Risiko-Lebendgeborenen	<p><b>Neuer Qualitätsindikator</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Berechnungsart: Logistische Regression (O/E)</li> <li>• Referenzbereich: 95. Perzentil</li> <li>• Zähler: Verstorbene Kinder</li> <li>• Nenner: Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen, die zuvor in keiner anderen Kinderklinik (externer Kinderklinik oder externer Klinik als Rückverlegung) behandelt wurden, und mit einem Gestationsalter von mindestens 32+0 Wochen p. m. und einem Geburtsgewicht von mindestens 1.500 g</li> </ul> <p>Für die Risikoadjustierung wurden die Koeffizienten auf der Datenbasis des Auswertungsjahres 2024 neu berechnet. Folgende Risikofaktoren werden berücksichtigt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Geschlecht</li> <li>• Asphyxie mit/ ohne HIE</li> <li>• Gestationsalter 32/ 33/ 34 abgeschlossene SSW</li> </ul>
51901 - Qualitätsindex der Frühgeborenenversorgung	<p><b>Anpassung des Zählers</b></p> <p>Zum Auswertungsjahr 2025 werden im Zähler innerhalb von Ebene 3 „Nekrotisierende Enterokolitis (NEK)“ (QI ID 51146_51901) auch die fokale intestinale Perforation (FIP) / singuläre intestinale Perforation (SIP) berücksichtigt. Die neue Definition lautet „Kinder mit nekrotisierender</p>

	Enterokolitis (NEK) oder mit fokaler intestinaler Perforation (FIP) / singulärer intestinaler Perforation (SIP), die während des aktuellen Aufenthaltes erstmalig aufgetreten ist“.
<b>50062</b> - Pneumothorax unter oder nach Beatmung	<b>Anpassung der Risikoadjustierung</b> Beim Gestationsalter werden die abgeschlossenen SSW 32 und 33 nicht mehr berücksichtigt.
<b>50063</b> - Durchführung eines Hörtests	<b>Anpassung der Nenner Definition</b> Zum Auswertungsjahr 2025 werden im Nenner zusätzlich Kinder mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 23+6 Wochen berücksichtigt. Die neue Definition lautet: Alle lebend nach Hause entlassenen Kinder ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 22+0 Wochen p. m.
<b>50069</b> - Aufnahmetemperatur unter 36,0 °C bei sehr kleinen Frühgeborenen	<b>Anpassung der Nenner Definition</b> Zum Auswertungsjahr 2025 werden im Nenner zusätzlich Kinder mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 23+6 Wochen berücksichtigt. Die neue Definition lautet: Alle Lebendgeborenen ohne primär palliative Therapie (ab Geburt) und ohne schwere oder letale angeborene Erkrankungen mit einem Gestationsalter von mindestens 22+0 Wochen p. m. und mit einer Angabe zur Aufnahmetemperatur und einem Geburtsgewicht unter 1.500 g o-der einem Gestationsalter unter 32+0 Wochen p. m.